

Exemple de politique 3

Méthodes approuvées de prophylaxie préexposition (PrEP) pour la prestation différenciée de services de PrEP

Les méthodes de PrEP suivantes ont été approuvées, et les présentes orientations définissent les possibles modèles de prestation différenciée de services en la matière pour l'ensemble de ces méthodes.

(Insérer les méthodes de PrEP approuvées par le pays)

Les contraintes et les limites associées à la prestation de services sont indiquées ci-dessous, par méthode approuvée.

a. PrEP par voie orale (quotidienne ou ponctuelle)

- Prescription initiale et renouvellement par *(insérer les prestataires de services habilités)*
- Aucune exigence de réfrigération. Entreposage en toute sécurité à température ambiante.

b. Anneau vaginal imprégné de dapivirine

- Prescription initiale et renouvellement par *(insérer les prestataires de services habilités)*
- Aucune exigence de réfrigération. Entreposage en toute sécurité à température ambiante.
- Les anneaux vaginaux imprégnés de dapivirine sont insérés mensuellement par la personne utilisant la PrEP et ne requièrent pas de consultation en personne.

c. Cabotégavir injectable à longue durée d'action

- Prescription initiale et renouvellement par *(insérer les prestataires de services habilités)*
- Aucune exigence de réfrigération. Entreposage en toute sécurité à température ambiante.
- Les deux premières injections doivent se faire à quatre semaines d'intervalle. Par la suite, une dose de rappel est requise tous les deux mois.
- Administration de l'injection par *(insérer les prestataires de services habilités à réaliser des injections fessières intramusculaires)*
- *(Insérer toute PrEP par voie orale requise devant être introduite ou arrêtée conformément aux lignes directrices nationales relatives à la PrEP)*