

Exemplo de políticas 6

Elementos constitutivos da prestação de serviços diferenciados de PrEP

Os elementos constitutivos das componentes da prestação de serviços diferenciados de PrEP estão delineados no quadro 2. Estes elementos constitutivos (QUANDO – frequência do serviço, ONDE – localização do serviço, QUEM – prestador do serviço e O QUÊ – pacote de serviços) podem ser utilizados para adaptar um modelo existente ou construir um novo modelo adequado a uma população ou contexto geográfico específico.

A secção “continuação” à direita do quadro define elementos constitutivos para pessoas que utilizam a PrEP para além de uma curta duração e que são avaliadas como adequadas (ver a secção 5 acima).

Quando alguém não é adequado para a prestação de serviços diferenciados de PrEP menos intensivos durante a fase de continuação no momento da avaliação, devem ser-lhe oferecidas recargas de PrEP prolongadas combinadas com consultas clínicas. A menos que clinicamente indicado, não lhes deve ser exigida a realização de visitas clínicas frequentes. As recargas de PrEP oral ou de anel vaginal com dapivirina em conjunto com uma consulta clínica devem ser trimestrais e, no caso das pessoas que recebem cabotegravir injetável de ação prolongada, as visitas devem ser combinadas com periodicidade bimestral. Além disso, os clientes devem ser reavaliados em cada visita, de modo a verificar a sua adequação a modelos de prestação de serviços diferenciados de PrEP menos intensivos.

Quadro 2: Elementos constitutivos da prestação de serviços diferenciados para avaliação, iniciação e seguimento precoce (0-3 meses) e continuação da PrEP (>3 meses)

CAN – cuidados antenatais; TAR – terapia antirretroviral; PF – planeamento familiar; ATVIH – autoteste do VIH; STV – serviços de teste do VIH; SMI – saúde materno-infantil; DNT – doença não transmissível; UA – unidade de ambulatório; PEP – profilaxia pós-exposição; CPN – cuidados perinatais; IST – infeção sexualmente transmissível

Avaliação, iniciação e seguimento precoce da PrEP (0-3 meses)				Continuação da PrEP (para pessoas adequadas à prestação de serviços de PrEP menos intensivos). Quando não adequadas, devem, no mínimo, ser oferecidas às pessoas consultas clínicas combinadas e recargas de PrEP para 3 meses (oral/anel) ou 2 meses (injetável).	
	Avaliação da PrEP (após resultado negativo no teste do VIH)	Iniciação/reiniciação da PrEP ^c	Seguimento clínico inicial	Recarga/injeção de PrEP apenas	Consulta clínica
 QUANDO	Imediatamente após teste do VIH (ou poderá ser oferecida no momento da criação de procura de teste do VIH para a população elegível para PrEP)	Iniciação no mesmo dia na sequência de aceitação da oferta de PrEP, se disponível no local Caso não seja possível à pessoa comparecer no local de iniciação da PrEP no mesmo dia, no prazo de 7 dias do STV	<u>Oral/anel</u> : Um mês após a iniciação PRESENCIAL OU um mês após a iniciação VIRTUAL e 3 meses após a iniciação PRESENCIAL <u>Injetável</u> : Um mês após a iniciação PRESENCIAL (pode ser mensal até ao 3.º mês para permitir injeções mensais de introdução)	De 3 em 3 meses (de 2 em 2 meses se injetável) (Apenas oral: De 6 em 6 meses para duração prolongada avaliada como adequada)	De 6 em 6 meses (Apenas oral: De 12 em 12 meses para duração prolongada avaliada como adequada)
 ONDE	Todos os locais de teste do VIH – comunitários ou em unidades de saúde	Local de proximidade comunitária Serviços de teste do VIH em unidade de saúde especificada (serviço de PF ou STV em UA ou serviço de IST, se independente de UA, ou serviço de CAN-SMI ou serviço de TAR ^a) Farmácia ou local de dispensa de medicamentos comunitário	Pontos virtuais ou comunitários apoiados por serviços de proximidade Serviço da unidade de saúde em que a iniciação teve lugar	De base comunitária: Ponto comunitário (por exemplo, farmácia, centro de acolhimento, proximidade móvel ou entrega ao domicílio) Com base em unidade de saúde: Serviço designado para a recolha de recargas rápidas e/ou a administração de injeções (por exemplo, planeamento familiar ou farmácia, no caso de autoteste do VIH)	Ponto comunitário apoiado por serviços de proximidade Serviço da unidade de saúde em que a iniciação teve lugar <i>As componentes do pacote de serviços também podem ser disponibilizadas virtualmente através da abordagem de telemedicina</i>
 OMS	Todos os profissionais de saúde que fornecem serviços de teste do VIH, incluindo os trabalhadores de saúde não profissionais (ou congéneres que distribuem kits de autoteste do VIH)	Enfermeiro(a) de proximidade ^b Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ^b (enfermeiro(a) de PF, enfermeiro(a) designado(a) de UA que apoia o STV, enfermeiro(a) de IST, enfermeiro(a) de CAN, enfermeiro(a) de CPN ou enfermeiro(a) de TAR) Farmacêutico do setor privado	Presencial: Enfermeiro(a) de proximidade ^b ou enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ^b Apenas virtual: Trabalhador de saúde não profissional qualificado e supervisionado	Trabalhador de saúde não profissional qualificado, farmacêutico ou congénere (para injetáveis – estipular o prestador autorizado a administrar a injeção)	Enfermeiro(a) de proximidade ^b ou enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ^b

 O QUÊ	Criação de procura de PrEP Avaliação inicial da elegibilidade para PrEP com base em critérios nacionais Oferta de PrEP Encaminhamento e orientação imediatos para enfermeiro(a) para iniciação de PrEP (se disponível no local ou a pessoa pode comparecer noutro local de iniciação) Em alternativa, sugerir opções de locais de iniciação da PrEP e agendar consulta no prazo de 7 dias	Confirmar a avaliação de elegibilidade para a PrEP Despistar quanto à elegibilidade para a PEP (com plano de transição para a PrEP após a conclusão da PEP e novo teste do VIH) Despistagem de infeção aguda por VIH Aconselhamento sobre a utilização efetiva e a descontinuação^{c2} Aconselhamento sobre a redução do risco sexual e do consumo de substâncias^{c1} Avaliação da duração de utilização prevista da PrEP (curta, média ou prolongada) Avaliar e oferecer métodos apropriados (orais diários, orais induzidos por eventos, anel ou injetáveis)^{c2} Dependente do tempo de seguimento inicial presencial: <u>Oral ou anel:</u> 1 ou 3 meses com roteiro de medicação e recarga (e kit de autoteste do VIH para uso domiciliário) <u>Injetável:</u> Um mês com roteiro de medicação injetável e injeção (para introdução) As seguintes componentes do pacote podem ser alteradas para uma visita inicial de seguimento presencial se iniciada na comunidade: Antigénio de superfície da hepatite B (HBsAg)^{c1} Despistagem e tratamento de IST Teste de gravidez na urina Aconselhamento de PF e acesso à contraceção^{c2} Preservativos e lubrificantes	Virtual e presencial Teste do VIH (pode ser autoteste^{a)}) Despistagem de infeção aguda por VIH <u>Apenas anel:</u> verificar na inserção Tratar os efeitos secundários Breve análise da utilização efetiva Discutir a descontinuação da PrEP e caso o cliente decida descontinuar: orientar em relação à descontinuação Apenas virtual Chamar de novo à unidade de saúde em caso de resultados anormais e/ou aplicação deficiente do anel Apenas presencial <u>Apenas oral:</u> >30 anos ou comorbidade: Depuração de creatinina (eGFR) Vacina da hepatite B, caso não esteja infetado nem vacinado Se o cliente decidir continuar a PrEP: Avaliação da adequação e oferta de continuação de PrEP menos intensiva Roteiro de medicação para 6 meses <u>Oral/anel:</u> Duas recargas para 3 meses <u>Injetável:</u> Três injeções de 2 em 2 meses Preservativos e lubrificantes	Teste do VIH (pode ser ATVIH^a para uso domiciliário com demonstração e orientação sobre o que fazer em caso de resultado positivo do teste) Utilização efetiva e registo de descontinuação <u>Oral:</u> Recarga para 3-6 meses <u>Anel:</u> Recarga para 3 meses <u>Injetável:</u> 1 x injeção de PrEP Preservativos e lubrificantes Reencaminhamento se necessário	Seguir as orientações clínicas sobre a PrEP Teste do VIH Despistagem de infeção aguda por VIH Despistar efeitos secundários e tratá-los Breve análise da utilização efetiva e do aconselhamento sobre o risco sexual Despistagem e tratamento de IST <u>Apenas oral:</u> Depuração de creatinina (eGFR): >50 anos, comorbidade ou resultado anterior de <90 ml/min: Discutir a descontinuação da PrEP e caso o cliente decida descontinuar: orientar em relação à descontinuação Gerir as DNT e outras comorbidades No caso das mulheres: Avaliação de PF e roteiro consonante Roteiro de PrEP para 6-12 meses <u>Oral:</u> Duas recargas para 3-6 meses <u>Anel:</u> Duas recargas para 3 meses <u>Injetável:</u> Três injeções de 2 em 2 meses
--	--	---	---	---	---

- a O(s) local(ais) do serviço deve(m) ser considerado(s) da perspetiva do utilizador da PrEP. Entre os utilizadores de PrEP, só a prestação de serviços de PrEP no âmbito dos serviços de TAR é frequentemente comunicada como indesejável.
- b Todos os quadros de enfermagem podem prescrever e gerir a PrEP após formação em orientação de PrEP e não necessitam de formação em gestão da TAR.
- c Componentes do pacote de reiniciação que 1) não têm de ser repetidas ou que 2) podem ser abreviadas.
- d O ATVIH aprovado para utilização na PrEP inclui XXX (inserir ATVIH aprovado no país para utilização de PrEP).