


Exemplo de políticas 7B

Modelos de prestação de serviços diferenciados de PrEP por método de PrEP

Os quadros de síntese na secção 7B definem modelos de prestação de serviços diferenciados de PrEP para a fase de continuação da PrEP destinada a pessoas adequadas à prestação de serviços diferenciados de PrEP de intensidade reduzida **por método de PrEP**.

Nos modelos de PrEP menos intensivos, há uma alternância entre visitas apenas para recarga de PrEP e visitas de consulta clínica (figura 2).

Figura 2: Cronograma da prestação de serviços diferenciados de PrEP por tipo de visita



Quando é indicado ou solicitado apoio psicossocial adicional pela pessoa que utiliza a PrEP, o apoio psicossocial pode ser prestado separadamente (por exemplo, apoio virtual) ou durante as visitas para recarga de PrEP apenas (por exemplo, quando parte de um contexto de grupo de apoio).

É importante notar que a prestação de serviços diferenciados de PrEP de intensidade reduzida não se limita aos modelos descritos nos quadros seguintes. Estes modelos podem ser adaptados ou podem ser elaborados novos modelos utilizando os elementos constitutivos na secção 6.

Este exemplo de política está ligado à publicação, "IAS – the International AIDS Society". *Key considerations in developing policy guidance for differentiated PrEP service delivery: Country policy development brief*. July 2022." disponível em <https://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/Resource-Library/DSD-PrEP-policy-2022>

Descarregue uma versão em Word de um exemplo de política de prestação de serviços diferenciados de PrEP em <https://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/Resource-Library/PrEP-example-policy-word>

Para a PrEP oral (diariamente e/ou induzida por eventos)

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde		Modelos individuais baseados numa unidade de saúde		Modelos de grupo
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a	Entrega ao domicílio	Acelerado ^b 3MMD	Acelerado ^b 6MMD	Grupos de apoio que integram recargas de PrEP}
Duração em PrEP	1-3 meses (após 1.º seguimento inicial presencial)			12 meses	1-3 meses (após 1.º seguimento inicial presencial)
Elementos constitutivos	Recargas de PrEP				
 QUANDO	De 3 em 3 meses			De 6 em 6 meses	De 3 em 3 meses
 ONDE	Ponto comunitário	Em casa	Serviço acelerado de balcão único em unidade de saúde (farmácia [ATVIH apenas] ou PF, UA-STV, CAN, SMI e/ou TAR ^d)		Espaço comunitário, domicílio ou unidade de saúde
 QUEM	Prestador não profissional				
 O QUÊ					
Teste do VIH	ATVIH (cabina de autoteste do ponto comunitário ou em casa) ou teste rápido		ATVIH (cabina de autoteste da unidade de saúde ou em casa) ou teste rápido	1 teste rápido + 1 ATVIH (em casa 3 meses mais tarde) ou 2 ATVIH (0 m [cabina de autoteste em unidade de saúde ou em casa] + 3 m mais tarde [em casa])	ATVIH (cabina de autoteste em casa ou em unidade de saúde)
Pacote de serviços	Utilização efetiva e registo de descontinuação Recarga oral de PrEP para 3 meses Encaminhamento para unidade de saúde ou enfermeiro, se necessário				

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde		Modelos individuais baseados numa unidade de saúde		Modelos de grupo
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a	Entrega ao domicílio	Acelerado ^b 3MMD	Acelerado ^b 6MMD	Grupos de apoio que integram recargas de PrEP}
Elementos constitutivos:	Consultas clínicas				
 QUANDO	De 6 em 6 meses			De 12 em 12 meses	De 6 em 6 meses
 ONDE	Unidade de saúde ou ponto comunitário apoiado por serviço de proximidade móvel da unidade de saúde		Serviço em unidade de saúde onde teve lugar a iniciação da PrEP ou serviço designado para a gestão da continuação da PrEP ^d		Unidade de saúde ou ponto comunitário apoiado por serviço de proximidade móvel da unidade de saúde
 QUEM	Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ou enfermeiro(a) de proximidade		Enfermeiro(a) de serviço de UA, IST, PF, CAN, SMI ou TAR		Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ou enfermeiro(a) de proximidade
 O QUÊ					
Teste do VIH	Teste rápido			Teste rápido + 1 ATVIH (3 meses mais tarde em casa)	Teste rápido
Pacote de serviços	Seguir orientações clínicas sobre a PrEP Despistar infeção aguda por VIH (encaminhar para serviço de TAR, se positivo) Despistar efeitos secundários e tratá-los Breve análise da utilização efetiva e do aconselhamento sobre o risco sexual Discutir a descontinuação da PrEP e, em caso de decisão de descontinuar, orientar sobre a abordagem adequada à descontinuação Despistar e tratar IST Depuração de creatinina (eGFR): >50 anos/comorbidade/resultados anteriores de <90 ml/min No caso das mulheres: Avaliação de PF e roteiro consonante				
	Roteiro de PrEP para 6 meses: 2 recargas de PrEP para 3 meses Dispensar recarga para 3 meses			Roteiro de PrEP para 12 meses: Duas recargas de PrEP para 6 meses Dispensar recarga para 6 meses	Roteiro de PrEP para 6 meses: Duas recargas de PrEP para 3 meses Dispensar recarga para 3 meses
Elementos constitutivos:	Apoio psicossocial				
 QUANDO	Ligação opcional para plataforma virtual				De 3 em 3 meses
 ONDE					Espaço comunitário ou casa de um membro do grupo ou serviço na unidade de saúde específico da população (espaços para adolescentes) ou plataforma virtual
 QUEM					Trabalhador de saúde não profissional ou congénere qualificado
 O QUÊ	Apoio dos pares e/ou psicossocial Educação sobre a utilização efetiva, risco sexual, métodos de PrEP e descontinuação Demonstração e educação sobre ATVIH em casa e o que fazer em caso de resultado positivo no teste do VIH				

Para anéis vaginais

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde		Modelos individuais baseados numa unidade de saúde	Modelos de grupo
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a	Entrega ao domicílio	Acelerado ^b 3MMD	Grupos de apoio que integram recargas de PrEP}
Duração em PrEP	1-3 meses (após 1.º seguimento inicial presencial)			
Elementos constitutivos	Recargas de PrEP			
 QUANDO	De 3 em 3 meses			
 ONDE	Ponto comunitário	Em casa	Serviço acelerado de balcão único em unidade de saúde (farmácia [ATVIH apenas] ou PF, UA-STV, CAN, SMI e/ou TAR ^d)	Espaço comunitário, domicílio ou unidade de saúde
 QUEM	Prestador não profissional			
 O QUÊ				
Teste do VIH	ATVIH (cabina de autoteste do ponto comunitário ou em casa) ou teste rápido		ATVIH (cabina de autoteste em unidade de saúde ou em casa) ou teste rápido	ATVIH (cabina de autoteste em casa ou em unidade de saúde)
Pacote de serviços	Utilização efetiva e registo de descontinuação 3x anel vaginal Encaminhamento para unidade de saúde ou enfermeiro, se necessário			
Elementos constitutivos	Consultas clínicas			
 QUANDO	De 6 em 6 meses			
 ONDE	Unidade de saúde ou ponto comunitário apoiado por serviço de proximidade móvel da unidade de saúde		Serviço em unidade de saúde onde teve lugar a iniciação da PrEP ou serviço designado para a gestão da continuação da PrEP ^d	Unidade de saúde ou ponto comunitário apoiado por serviço de proximidade móvel da unidade de saúde
 QUEM	Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ou enfermeiro(a) de proximidade		Enfermeiro(a) de serviço de UA, IST, PF, CAN, SMI ou TAR	Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ou enfermeiro(a) de proximidade
 O QUÊ				
Teste do VIH	Teste rápido			
Pacote de serviços	Seguir orientações clínicas sobre a PrEP Despistar infeção aguda por VIH (encaminhar para serviço de TAR, se positivo) Despistar efeitos secundários e tratá-los Breve análise da utilização efetiva e do aconselhamento sobre o risco sexual Discutir a descontinuação da PrEP e, em caso de decisão de descontinuar, orientar sobre a abordagem adequada à descontinuação Despistar e tratar IST No caso das mulheres: Avaliação de PF e roteiro consonante Roteiro de PrEP para 6 meses: 2x3 anéis vaginais Dispensar 3 anéis vaginais			

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde		Modelos individuais baseados numa unidade de saúde	Modelos de grupo
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a	Entrega ao domicílio	Acelerado ^b 3MMD	Grupos de apoio que integram recargas de PrEP}
Elementos constitutivos	Apoio psicossocial			
 QUANDO	Ligação opcional para plataforma virtual			De 3 em 3 meses
 ONDE				Espaço comunitário ou casa de um membro do grupo ou serviço na unidade de saúde específico da população (espaços para adolescentes) ou plataforma virtual
 QUEM				Trabalhador de saúde não profissional ou congénere qualificado
 O QUÊ	Apoio dos pares e/ou psicossocial Educação sobre a utilização efetiva, risco sexual, métodos de PrEP e descontinuação Demonstração e educação sobre ATVIH em casa e o que fazer em caso de resultado positivo no teste do VIH			

Para PrEP injetável

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde ^f	Modelos individuais baseados numa unidade de saúde
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a com administração de injeções	PrEP acelerada ^{b< 1} injetável
Duração em PrEP	3 meses (após conclusão de qualquer período de introdução)	
Elementos constitutivos	Administração de injeção de PrEP	
 QUANDO	De 2 em 2 meses	
 ONDE	Pontos comunitários com capacidade para administrar injeções	Serviço de planeamento familiar ou sala de administração de injeções dedicada
 QUEM	Enfermeiro(a) de farmácia privada ou enfermeiro(a) de proximidade ou prestador de serviços autorizado ^e	Enfermeiro(a) de PF ou enfermeiro(a) de administração de injeções dedicado(a)
 O QUÊ		
Teste do VIH	Teste rápido	
Pacote de serviços	Utilização efetiva e registo de descontinuação 1x administração de injeção Encaminhamento para unidade de saúde/enfermeiro, se necessário	

	Modelos individuais NÃO baseados em unidades de saúde ^f	Modelos individuais baseados numa unidade de saúde
Nome do modelo	Ponto comunitário ^a com administração de injeções	PrEP acelerada ^{b< 1j} injetável
Elementos constitutivos	Consultas clínicas	
 QUANDO	De 6 em 6 meses	
 ONDE	Unidade de saúde ou ponto comunitário com serviço de proximidade móvel da unidade de saúde	Serviço em unidade de saúde onde teve lugar a iniciação da PrEP ou serviço designado para a gestão da continuação da PrEP ^d
 QUEM	Enfermeiro(a) baseado(a) em unidade de saúde ou enfermeiro(a) de proximidade	Enfermeiro(a) de serviço de UA, IST, PF, CAN, SMI ou TAR
 O QUÊ		
Teste do VIH	Teste rápido	
Pacote de serviços	Seguir orientações clínicas sobre a PrEP Despistar infeção aguda por VIH (encaminhar para serviço de TAR, se positivo) Despistar efeitos secundários e tratá-los Breve análise da utilização efetiva e do aconselhamento sobre o risco sexual Discutir a descontinuação da PrEP e, em caso de decisão de descontinuar, orientar sobre a abordagem adequada à descontinuação Despistar e tratar IST No caso das mulheres: Avaliação de PF e roteiro consonante Roteiro de PrEP para 6 meses: 3x injetável Administrar 1x injeção	
Elementos constitutivos	Apoio psicossocial	
 QUANDO	Ligação opcional para plataforma virtual	
 ONDE		
 QUEM		
 O QUÊ	Apoio dos pares e/ou psicossocial Educação sobre a utilização efetiva, risco sexual, métodos de PrEP e descontinuação Demonstração e educação sobre ATVIH em casa e o que fazer em caso de resultado positivo no teste do VIH	

Notas:

- a Os pontos comunitários são farmácias/locais de dispensa de medicamentos privados ou comunitários, máquinas de venda, pontos comunitários fixos, incluindo escritórios de OBC e centros de acolhimento de populações-chave, bem como proximidade móvel (por exemplo, para centros de registo de populações-chave ou centros de juventude)
- b Acelerado: na visita apenas para recarga, o cliente não deve precisar de se apresentar para registo ou recolha de processos e só deve frequentar um ponto de atendimento para um serviço acelerado, sem necessidade de consultar um médico, a não ser para a administração de injeções.
- c As recargas de PrEP podem ser integradas em grupos de apoio existentes estabelecidos para necessidades de apoio psicossocial que não sejam especificamente de PrEP ou podem ser formados grupos específicos para fornecer e apoiar a utilização eficaz da PrEP.
- d O(s) local(ais) do serviço deve(m) ser considerado(s) da perspetiva do utilizador da PrEP. Entre os utilizadores de PrEP, só a prestação de serviços de PrEP no âmbito dos serviços de TAR foi comunicada como indesejável. Deve ser ponderado um ponto de atendimento numa unidade de saúde alternativa ou adicional.
- e Caso o país permita contraceptivo injetável administrado por prestador qualificado (que não seja um enfermeiro profissional ou um médico).
- f A PrEP injetável também pode ser administrada em casa por um(a) enfermeiro(a) de proximidade a populações-alvo específicas em contextos com capacidade de recursos suficiente.

Abreviaturas:

CAN – cuidados antenatais; TAR – terapia antirretroviral; OBC – organização de base comunitária; PF – planeamento familiar; ATVIH – autoteste do VIH; STV – serviços de teste do VIH; SMI – saúde materno-infantil; MMD – dispensa durante vários meses; UA – unidade de ambulatório; IST – infeção sexualmente transmissível

Este exemplo de política está ligado à publicação, "IAS – the International AIDS Society". *Key considerations in developing policy guidance for differentiated PrEP service delivery: Country policy development brief*. July 2022." disponível em <https://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/Resource-Library/DSD-PrEP-policy-2022>

Descarregue uma versão em Word de um exemplo de política de prestação de serviços diferenciados de PrEP em <https://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/Resource-Library/PrEP-example-policy-word>